



دليل السلامة الخاص بالأدوية أفيونية المفعول

نصائح مهمة للعائلات

نصائح حول الاستخدام الآمن للأدوية أفيونية المفعول

التزم بالتعليمات

هناك مخاطر قد تنجم عن تغيير مواعيد تناول الأدوية أو الجرعة الموصوفة. اتبع التعليمات الموضحة على ملصق الدواء وأية معلومات يقدمها لك الطبيب الذي وصف الدواء.



التخزين الآمن

احرص على الاحتفاظ بالأدوية في مكان آمن. يجب أن تحفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات المنزلية الأليفة.



اطلع على الآثار الجانبية

اسأل فريق الرعاية الصحية لديك عن الأشياء اللازم مراقبتها أثناء تناول الأدوية.

قد تتضمن الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:
الإمساك والوخز و النعاس والقيء والشعور بالدوار



قد تتضمن الآثار الجانبية المهمة ما يلي: انخفاض ضغط الدم، التنفس الضحل، بطء التنفس

اقرأ الملصق بعناية

لا تستخدم إلا الأدوية التي يصفها الطبيب لك فقط. إذا لم يكن اسمك على الزجاجة، فلا تستخدم الدواء.



عليك إعادة الأدوية التي لم يتم استخدامها

أعد الأدوية التي لم تتناولها في Holland Bloorview من أجل التخلص منها بطريقة آمنة. يحظر مشاركة الأدوية الخاصة بك التي لم تستخدمها مع الآخرين.



تحدث إلى الفريق الخاص بك

تواصل مع فريق الرعاية الصحية لديك إذا كانت لديك أية مخاوف أو استفسارات بشأن:

- ما تشعر به من ألم
- الأدوية الخاصة بك
- تجربة أية أدوية جديدة (موصوفة أو غير موصوفة من قِبل الطبيب)
- أية مخاوف أخرى



دعنا نتعرف على تلك المخاوف على الفور!

المسكنات الأفيونية هي أدوية يمكن استخدامها بأمان وفعالية للتعامل مع الألم. لذا نود أن نقدم لكم معلومات واضحة حول كيفية استخدام هذه الأدوية المهمة.

من أمثلة الأدوية أفيونية المفعول: المورفين والهيدرومورفين والأكسيكودون.

تطالبنا وزارة الصحة الكندية بوضع اللاصقة التحذيرية هذه على عُلَب الأدوية أفيونية المفعول، إلى جانب تقديم النشرة المجانية "الأدوية أفيونية المفعول - معلومات مهمة للمرضى والعائلات".

قد تتسبب الأدوية أفيونية المفعول
الالتكالية والإدمان والجرعة الزائدة.



Health Canada Santé Canada

الأدوية أفيونية المفعول

معلومات خاصة بالمرضى والعائلات

لقد تم وصف دواء أفيوني المفعول لك لعلاج ما لديك من ألم أو لسبب مرضي آخر.

تحدث إلى طبيبك أو الطبيب الصيدلي إذا:

- كان لديك أسئلة بشأن الدواء أفيوني المفعول الذي تتناوله.
- كنت لا تفهم التعليمات الخاصة باستخدام الدواء الأفيوني المفعول الذي تم وصفه لك.
- ظهرت عليك آثار جانبية أو ساءت حالتك الصحية.

علامات تناول جرعة زائدة	التحذيرات الخطيرة
<ul style="list-style-type: none">• الهلوس• الاضطراب• صعوبة في المشي• الشعور بالنعاس / الدوخة البالغة• بطء التنفس أو التنفس بشكل غير طبيعي	<ul style="list-style-type: none">• الجرعة الزائدة من الأدوية الأفيونية المفعول قد تسبب الوفاة. الاحتمال الأكبر لتناول جرعة زائدة قد يحدث عند تناول جرعات أكثر مما وصفه الطبيب أو في حالة تناول الأدوية أفيونية المفعول مع المنشورات الكحولية أو مع أدوية مسكنة أخرى (مثل أقراص المنوم، أدوية علاج الأرق ووصفات الأكتئاب ومرخبات الأعصاب).• الإدمان قد يحدث حتى في ظل تناول الأدوية أفيونية المفعول بالجرعة الموصوفة من قِبل الطبيب.• الاتكالية البدنية قد يحدث ذلك عند استخدام أدوية أفيونية المفعول يوميًا. وقد يتسبب ذلك في صعوبة التوقف عن تناول هذه الأدوية.

هل ترغبون في التناقش حول الأدوية التي تتناولونها أثناء إقامتكم في مستشفى Holland Bloorview؟

تحدث إلى:

- الصيدلي
- الطبيب
- الممرضة
- الممرضة الممارسة